



Jó tanácsok kertészkedőknek – Lelkes Róbert rovata

Hogyan neveljük egészséges palántákat

Már kifelé araszolunk a télből, túl vagyunk a pálfordulón, és hogy a mondást idézzem: „Pálnak fordulása, fél tél elmúlása!” Mivel februárban gyakoriak a hőmérséklet-ingadozások, az aktuális időjárástól függ, hogy a szabadban milyen munkákat tudunk elvégezni. Ezen kinti munkák talán egyik legfontosabbja a téli metszés. Az alma és körte esetében akkor végezzük, amikor már nem valószínű, hogy -10°C alá csökken a hőmérséklet. Magát a metszést mindenképp fagymentes időben végezzük. A szőlő, a sárga, és őszibarack metszését hagyjuk március első felére. Hasznos lehet továbbá a fák törzsének letisztítása, a sebek fabalzamsammal való kezelése és ezt követően mésztejjel való lekenése. Ez utóbbi gátolja a repedések kialakulását, és elősegíti a fagy elleni védelmet is. A fagyok elmúltával fontos elvégezni a gyümölcsfák és díszbokrok kora tavaszi lemosó permetezését réztartalmú növényvédő szerekkel (Kuprikol 50, Champion 50WP). Ez a növények számára olyan, mint az ember számára a reggeli mosakodás.

Aki palántanevelésre adja a

fejét, az már fokozatosan beszerezte a szükséges vetőmagokat. Palántázni azokat a melegigényes és hosszabb tenyészidejű növényeket érdemes, amelyek helyre vetéssel később érnek be. Ilyen például a paprika, paradicsom, a káposztafélék, a zeller, uborka és a dinnye. Ha betartunk egy pár szabályt, akár a lakásban meleg és világos helyen is képesek vagyunk jó minőségű palántát kinevelni. A legfontosabbak a következők: 1. az alap a jó vetőmag, 2. a megfelelő palántaföld, 3. kellő hőmérséklet és fényerősség. Ehhez persze hozzájárul a rendszeres öntözés, a tápanyag-utánpótlás és a növényvédelem. A megfelelő palántaföld felhasználásával jelentősen csökkenthetjük a palántanevelők rémének, a palántadőlésnek a veszélyét. Ennek a gombabetegségnek vegyszeres kezeléssel (Previcur) is elejét vehetjük. A palántanevelésre használt edény lehet műanyag virágláda, lapos tálca vagy akár virágcserep, lényeges azonban, hogy az alján legyen nyílás, amelyen keresztül a felesleges víz el tud szivárogni. A földréteg vastagsága lehetőleg haladja meg a 6 cm-t. A

magokat vetés után cca 10-15 mm földdel betakarjuk, majd kelésig az edényt üveglappal vagy fóliával beföldjük. Miután a növénykék kikeltek, a melegen és a vízen kívül sok fényre is szükségük van. Körülbelül 2-3 héttel a kelés után a növényeket érdemes átültetni műanyag- vagy tőzegpohárkákba. A paprika, paradicsom és uborka esetében ezt az átültetést, más néven pikírozást a 3. levél megjelenése után végezzük. Ne feledkezzünk meg a tápoldatozásról sem. A pikírozás után foszfordús tápoldatozást végzünk, ami elősegíti a gyökérzet megerősödését. Fontos szabály, hogy borult időben 5°C -kal csökkentjük a palántanevelő hőmérsékletét, egyébként a palánták megnyúlnak. Eleinte 3-4 naponként, pikírozás után 2 naponként, kiültetés előtt 2 naponként öntözünk. Két héttel a kiültetés előtt a palántákat ajánlatos szoktatni a nyersebb körülményekhez azzal, hogy nappalra kivisszük őket az üvegházba, illetve fóliasátorba, azaz eddük őket.

A mellékelt táblázat egyszerűsített formában egy kis betekintést nyújt a palántanevelés rej-

telmeibe. Ha végül sikerül szép, egészséges palántákat kinevelnünk, joggal lehetünk büszkéek „csemetéinkre”, amelyek gondoskodásunkat gazdag termésel hálálják majd meg.

A díszkertben a kemény fagyok elmúltával a nyáron virágzó díszfák és bokrok elhalt, elfagyott ágvegei szintén visszavághatók. Hasonló a helyzet az élő sövényvel is. Az egyes hajtásokat sövénynyíróval kívánt magasságra és alakra formáljuk. A kerti tavaknál ellenőrizzük a vízminőséget, az esetleges repedéseket, valamint azt, hogy a tó élővilága hogyan vészelté át a téli időszakot. A pázsittal még nem kell foglalkozni ebben az időszakban, sőt járkalni sem ajánlatos rajta.

Ha a kedvezőtlen időjárás miatt nem tudunk a szabadban tevékenykedni, ellenőrizzük a kerti szerszámainkat (törött vagy megrepedt nyelvek, kilazult ék, életlen kapa). Ne feledkezzünk meg a kerti gépeink tavaszi karbantartásáról, illetve szervizeléséről sem, hiszen hamarosan szükségünk lesz rájuk.

(A szerző a Gazda sor 41. szám alatti Agrosam üzlet tulajdonosa)

| | A vetés dátuma a természetstől függően | | | A vetés mélysége | Csírázási hőfok | Kelési idő | Hőfok kelés után |
|---------------|--|---------------------|-----------|------------------|-----------------|------------|------------------|
| | Fűtetlen üvegház | Fűtetlen fóliasátor | Kinti | | | | |
| Paprika | febr. 1. | febr. 10. | márc. 1. | 10-15 mm | 25–28°C | 8-12 nap | 21°C |
| Paradicsom | febr. 10. | febr. 20. | márc. 10. | 10-15 mm | 23–25°C | 5-10 nap | 18°C |
| Káposztafélék | | | febr. 10. | 10 mm | 20°C | 7-12 nap | 16 – 17°C |
| Zeller | | | febr. 10. | 5 mm | 20–25°C | 18-21 nap | 18°C |
| Salátuborka | márc. 20. | márc. 25. | | 15-17 mm | 25–28°C | 5-7 nap | 21°C |

| | A pikírozás időpontja | Hőfok pikírozás után napos időben | Hőfok pikírozás után borús időben * | Kiültetés | | |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | üvegházi | fóliasátor | kinti |
| Paprika | A 4-5 hét után (3. levél) | 22 – 24°C | 17 – 19°C | ápr. 18. | ápr. 25. | máj. 20. |
| Paradicsom | A 4 hét után (3. levél) | 20 – 22°C | 15 – 17°C | ápr. 18. | ápr. 25. | máj. 20. |
| Káposztafélék | | | | | | márc. 20. |
| Zeller | 6 hét (3. levél) | 20°C | 15°C | | | máj. 7. |
| Salátuborka | | | | ápr. 25. | máj. 1. | |